- **Informations par Indicateur Global (juillet 2025)**

IG16 - Nappes des calcaires du Jurassique moyen et supérieur des Charentes :

Les niveaux moyens mensuels sont partout orientés à la baisse dans ce secteur où la vidange a été plutôt conforme à la normale : 2 baisses d'une classe pour une hausse d'une classe. Celle-ci concerne le piézomètre d'Aigre (16), dont le niveau repasse donc de très bas à bas. Inversement, le niveau reste modérément haut à Charmé (16). Ailleurs, les niveaux sont modérément bas (3/6) à autour de la moyenne (1/6), pour un IPS moyen qui reste modérément bas.

IG17 - Nappes des calcaires crétacés du Périgord et du bassin Angoumois :

Les niveaux moyens mensuels sont partout orientés à la baisse dans ce secteur où la vidange a été plutôt conforme à la normale : 3 baisses d'une classe pour une hausse d'une classe et 6 piézomètres sans changement. L'IPS moyen reste ainsi autour de la moyenne, comme pour 4 des 10 piézomètres, quand 4 autres conservent un niveau modérément haut. Les deux derniers indicateurs présentent un niveau modérément bas (Saint-Agnant, 17), voire bas (Bourrou, 24).

IG18 - Nappes alluviales de la Garonne aval, de la Dordogne et de leurs principaux affluents :

Les niveaux moyens mensuels sont partout orientés à la baisse dans ce secteur où la vidange a toutefois été plutôt supérieure à la normale puisque 6 baisses d'une classe d'IPS sont mesurées contre 4 indicateurs sans changement. Cela contribue à faire disparaître le niveau haut restant à Latresne (33) et fait apparaître 2 niveaux bas à Porchères (33) et Tonneins (47). A Allasac (19), dans la vallée de la Vézère, où les données étaient insuffisantes en juin, le niveau est même très bas. Les autres niveaux se répartissent entre modérément bas (4/10), autour de la moyenne (2/10) et modérément hauts (2/10). L'IPS moyen passe d'autour de la moyenne à modérément bas.

IG19 - Nappes des formations plio-quaternaires du Bassin aquitain :

Les niveaux moyens mensuels sont partout orientés à la baisse dans ce secteur où la vidange a été un peu supérieure à la normale : 3 baisses d'une classe et 6 piézomètres sans changement. Cela contribue à faire apparaître deux niveaux bas à Brach (33) et Lanton (33), tandis que le niveau reste modérément haut à Belin-Béliet (33). Si les niveaux autour de la moyenne restent les plus nombreux (4/9), l'IPS moyen passe néanmoins d'autour de la moyenne à modérément bas.

IG20 - Nappes alluviales de l'Adour et du Gave de Pau :

Les niveaux moyens mensuels sont partout orientés à la baisse dans ce secteur où la vidange a toutefois été plutôt supérieure à la normale puisque 5 baisses d'une classe d'IPS sont mesurées contre 3 indicateurs sans changement. Si l'IPS moyen baisse également, il reste toutefois modérément bas, comme la moitié (4/8) des indicateurs ponctuels ; les autres se divisant également entre niveaux bas et autour de la moyenne. Pour l'Adour, les niveaux sont plus bas dans la partie amont alors qu'ils sont autour de la moyenne pour les deux points les plus en aval (Saint-Sever et Campet-et-Lamolère, 40). Enfin, malgré les prélèvements réguliers à Laloubère (65) en juillet, leur caractère régulier d'une année sur l'autre n'impacte pas l'IPS, qui reste modérément bas.

IG21 - Nappes alluviales de la Garonne amont et de ses principaux affluents :

Si les niveaux moyens mensuels sont presque partout orientés à la baisse (17/18), l'un des rares niveaux stables est observé dans la vallée de l'Ariège, à Montaut (09). Ce point de suivi fait aussi figure d'exception en matière d'évolution de l'IPS, qui passe de modérément bas en juin à autour de la moyenne en juillet. Ailleurs, la vidange a été un peu supérieure à la normale puisque 7 baisses d'une classe d'IPS sont mesurées contre 10 indicateurs sans changement. Toutefois, les niveaux inférieurs à la moyenne restent rares, avec seulement 2 niveaux modérément bas pour les deux piézomètres les plus en amont et les plus au sud : Bordes-de-Rivière (31) dans la vallée de la Garonne et Verniolle (09) dans celle de l'Ariège. En comparaison, 12 niveaux supérieurs à la moyenne sont observés, essentiellement dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Si la majorité correspond à des niveaux modérément hauts, les 3 seuls niveaux hauts du bassin Adour-Garonne sont également enregistrés dans ce secteur, à Bioule (82), Lacourt-Saint-Pierre (82) et Sauveterre-Saint-Denis (47). Malgré une légère baisse, l'IPS moyen reste donc modérément haut, un des deux seuls ensembles aquifères du bassin dans ce cas.

IG22 - Nappe des calcaires jurassiques karstifiés des Causses du Quercy et de leurs bordures :

Si les niveaux moyens mensuels sont presque partout orientés à la baisse (6/7), l'un des rares niveaux stables est observé pour la source de la Diège à Salles-Courbatiès (12). C'est la seule particularité de ce mois de juillet pour ces nappes karstiques, puisqu'aucun changement de classe d'IPS n'est observé, signe d'une vidange parfaitement conforme à la normale. L'IPS moyen reste donc modérément bas, comme 5 des 7 indicateurs, les niveaux étant autour de la moyenne pour les deux autres : la source de Rigal Bas à Gindou (46) et le piézomètre de Chauffour-sur-Vell (19).

IG26 - Nappes des calcaires jurassiques karstifiés des Grands Causses et de la bordure cévenole :

Dans ce secteur également, tous les niveaux moyens mensuels ne sont pas partout orientés à la baisse. Si ceux-ci restent largement majoritaires (7/9), il y a cette fois deux exceptions avec des niveaux stables pour les sources de Bastide à Sévérac-d'Aveyron (12) et des Douzes à Muret-le-Château (12). Cela n'empêche pas l'IPS de celle-ci de passer de modérément bas à bas. Trois autres sources enregistrent également une baisse d'une classe d'IPS, contre 4 sans changement et une hausse d'une classe pour la source de Bernardes à Chanac (48). Cela indique une vidange des nappes un peu supérieure à la normale pour un mois de juillet. Toutefois, avec 5 niveaux modérément hauts contre 3 inférieurs à la moyenne (2 modérément bas et un bas), l'IPS moyen reste autour de la moyenne.

IG37 - Nappes des calcaires jurassiques de la Brenne et du Poitou et karst de la Rochefoucauld :

Les niveaux moyens mensuels sont partout orientés à la baisse dans ce secteur où la vidange a toutefois été plutôt supérieure à la normale. En effet, si une hausse d'une classe d'IPS est mesurée et que 3 indicateurs conservent leur IPS de juin, 3 baisses sont observées, dont la seule baisse de 2 classes du bassin Adour-Garonne. Elle concerne le piézomètre de Saint-Projet-Saint-Constant (16), dont le niveau est désormais modérément bas. C'est également le cas pour celui de Chef-Boutonne (79), dont le niveau était toutefois bas en juin et, plus généralement, pour la majorité (4/7) des points de suivi du secteur. Les deux niveaux modérément hauts restants à Blanzay (86) au nord-est et à Tourtoirac (24) à l'extrémité sud suffisent toutefois pour que l'IPS moyen reste autour de la moyenne.

IG44 - Nappes des calcaires oligocènes de l'Entre-deux-Mers :

Les niveaux moyens mensuels sont orientés à la baisse pour les 3 points de suivi de ce secteur. Pour les deux qui présentent suffisamment de données pour le calcul de l'IPS, les niveaux sont autour de la moyenne, comme au mois de juin, signe d'une vidange conforme à la normale en juillet.

IG47 - Nappes des formations volcaniques du Massif Central :

Les niveaux moyens mensuels sont orientés à la baisse pour les 2 points de suivi de ce secteur. L'IPS mesuré correspond également à niveau très bas, alors qu'il était bas en juin. La vidange a donc été supérieure à la normale en juillet et cela confirme que ces nappes des formations volcaniques sont le secteur le plus déficitaire en eau souterraine du bassin, même si le faible nombre de points de suivi et leur concentration dans la partie nord du système aquifère doit permettre de nuancer ce constat.

IG52 - Nappes du socle des Cévennes, de Margeride, de Ségala et de la Montagne noire :

Les niveaux moyens mensuels sont orientés à la baisse pour 3 des 4 points de suivi de ce secteur, la source du Pradet à Mont-Lozère-et-Goulet (48) faisant partie des rares niveaux stables du bassin Adour-Garonne. La vidange a toutefois été plutôt supérieure à la normale en juillet, puisque 2 baisses d'une classe d'IPS sont mesurées contre 2 indicateurs sans changement. Cela fait apparaître un niveau bas à la source de Saint-Gal à Lachamp-Ribennes (48) et fait disparaître le dernier niveau supérieur à la moyenne du secteur, à la source 2 du Gail aux Salces (48). L'IPS moyen passe donc d'autour de la moyenne à modérément bas.

IG53 - Nappe des sables fauves et calcaires miocènes de l'Armagnac :

Les niveaux moyens mensuels ne sont orientés à la baisse que pour 2 des 4 points de suivi de ce secteur. Ils sont stables pour les piézomètres de Villeneuve-de-Marsan (40) et Pouydesseaux (40). Dans ce dernier, l'IPS correspond à un niveau très haut (un des 2 seuls du bassin dans ce cas), comme en mai (manque de données pour le qualifier en juin). Pour les 3 autres points de suivi, aucun changement de classe d'IPS n'est observé non plus, signe d'une vidange conforme à la normale. Seul secteur sans aucun niveau inférieur à la moyenne, son IPS moyen reste modérément haut, comme 2 des 4 indicateurs.

IG54 - Nappes du socle du plateau du Limousin et de la Chataigneraie :

Les niveaux moyens mensuels sont partout orientés à la baisse dans ce secteur où la vidange a été un peu supérieure à la normale : 3 baisses d'une classe et 5 piézomètres sans changement. Si la moitié des indicateurs (5/10) affichent un IPS modérément bas, ce secteur est celui des extrêmes :

- L'autre niveau très haut du bassin, à Mansac (19), est également enregistré dans un piézomètre qui présentait ce niveau en mai, mais pour lequel les données étaient insuffisantes en juin.
- A l'autre bout du spectre, deux des baisses de classe d'IPS se traduisent par des niveaux très bas en juillet, dans les deux piézomètres de Saint-Merd-les-Oussines (19).

La présence des données du piézomètre de Mansac suffit toutefois pour maintenir l'IPS moyen, qui reste donc modérément bas.

IG58 - Nappes du socle de la Combraille et du plateau de Millevaches :

Les niveaux moyens mensuels sont partout orientés à la baisse et partout modérément bas dans ce secteur. Pour 3 points de suivi (dont un avec insuffisamment de données en juin), cela correspond à un maintien de la classe d'IPS, signe d'une vidange conforme à la normale en juillet. Pour le dernier indicateur (Maussac, 19), cela correspond à une baisse d'une classe d'IPS.